

Polskie Towarzystwo  
Ochrony Ptaków jest  
organizacją pozarządową  
założoną w 1985 r. Główny  
nacisk w swojej działalności  
kładzie na ochronę terenów  
podmokłych, siedlisk wielu cennych  
gatunków fauny i flory.

**Chronimy cietrzewie,  
bo warto!**

**Podjęmowane działania to m.in.:**

- czynna ochrona terenów wodno-błotnych,
- wykup i dzierżawa gruntów w ważnych  
ostojach roślin i zwierząt,
- propagowanie ekstensywnego rolnictwa,
- uczestniczenie w działaniach prawnych  
chroniących ptaki i ich miejsca występowania,
- prowadzenie badań naukowych,
  - edukacja ekologiczna.



Rysunki: Marek Kołodziejczyk  
Tekst: Maria Potocka, Mariusz Rostkowski

**Polskie Towarzystwo  
Ochrony Ptaków**  
ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok  
sekretariat@ptop.org.pl  
tel./fax 85 664 22 55  
[www.ptop.org.pl](http://www.ptop.org.pl)



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA  
EUROPEJSKA



**Cietrzew *Tetrao tetrix***





### Samiec cietrzewia

Samiec cietrzewia, zwany kogutem ma pióra czarne z granatowym połyskiem. Pokrywy podogonowe są białe, podobnie jak lusterka i pręgi na skrzydłach. Nad okiem umiejscowiony jest fragment niecierzonej skóry, tworzący tak zwaną różę, która w okresie toków silnie pęcznieje. Sterówki są charakterystycznie wygięte, nadając nastroszonemu ogonowi kształt liry.

### Samica cietrzewia

Samica zwana kurą lub cieciorką jest znacznie mniejsza od samca. Ubarwienie piór jest koloru rdzawego, złotobrazowego z wyraźnym srebrnoszarym, falistym wzorem. Braw jest wąska a ogon lekko wcięty.




### Pisklę

Pisklęta okryte są puchem w tonacji od szarozółtego (brzuch) do rudobrazowego (grzbiet). Dziób piskląt jest brunatnoszary. Grzbiet, barki i skrzydła są rdzawobrazowe z ciemnobrazowymi paskami i plamkami, pierś lekko ruda. Nogi obrosnięte delikatnym, białożółtym puchem. Palce i pazury żółtoróżowe.

### Gniazdo

Samice zakładają starannie ukryte gniazdo na ziemi, wyścielają je trawą, mchem i własnymi piórkami. W kwietniu i maju kury znoszą w nich zwykle 7-10 szarozółtych, mocno plamkowanych jaj, które następnie przez około cztery tygodnie wytrwale wysiadują.



### Toki

Wiosną ptaki gromadzą się o świcie w miejscach zwanych tokowiskami. Na otwartych terenach koguty walczą pomiędzy sobą, strosząc pióra i bulgocząc konkurując o względy cieciorzek.

### Do głównych zagrożeń powodujących spadek liczebności cietrzewia należą:

- zmniejszanie się powierzchni odpowiednich biotopów, wskutek osuszania torfowisk, zalesiania powierzchni śródlęśnych i intensyfikacji rolnictwa,
- presja ze strony drapieżników, tj. lis, jenot, kuna, norka amerykańska i kruk,
- zmiany klimatyczne, widoczne w postaci ochłodzenia późnowiosennego oraz intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu.